

DENVER II E O CRESCIMENTO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM CONSULTA DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA.

Camila Cocan do Nascimento¹, Ana Llonch Sabates²

RESUMO

Introdução: Nas últimas décadas, o interesse pelo crescimento e desenvolvimento da criança tem sido objeto de políticas de atenção à saúde da criança em todo o mundo como resultado do aumento da sobrevivência infantil e do reconhecimento de que a prevenção de problemas ou doenças, nesse período, exerce efeitos duradouros no futuro da criança. **Objetivos:** identificar o diagnóstico nutricional de lactentes de um a seis meses de idade, que vivem em uma comunidade da zona sul do município de São Paulo, utilizando o escore-z do peso-para-estatura; verificar a classificação do Denver II aplicado a esses lactentes e relacionar o diagnóstico nutricional com a classificação do Denver II. **Método:** Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa, desenvolvido no Ambulatório do Núcleo São Lucas, localizado em uma comunidade da zona sul do município de São Paulo. A amostra foi constituída por 43 prontuários de lactentes atendidos no período de 2009 a 2012 que compareceram em pelo menos quatro das seis consultas de enfermagem programadas. **Resultados:** Em relação ao estado nutricional a maioria dos lactentes apresentou escore z *entre* ≥ -2 e $\leq +1$ com diagnóstico de “eutrofia”, 14 apresentaram escore $\geq z + 1$ e $\leq + 2$, diagnosticados como “risco para sobrepeso” e oito com escore $\geq z + 2$ e $\leq -z + 3$ considerados como “sobrepeso”; em relação à classificação do Denver II o escore “passou” mostrou equilíbrio nas quatro áreas do desenvolvimento, com pequeno destaque para a área pessoal social; as áreas motor grosso (42%) e motor fino (28%) apresentaram maior percentual de “cautelas”; a maioria dos lactentes apresentou teste de Denver II normal; 15 lactentes tiveram Denver II suspeito. **Conclusão:** Dos 157 lactentes com diagnóstico nutricional de “eutrofia” 78 apresentaram Denver II normal e 11 suspeito, dos 13 lactentes com “risco de sobrepeso” seis apresentaram Denver II normal e um suspeito e os oito lactentes com sobrepeso tiveram Denver II normal.

DESCRITORES: Crescimento; Estado nutricional; Enfermagem Neonatal.

¹ Aluna do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Guarulhos (UnG).

² Enfermeira. Professora Titular da Universidade Guarulhos (UnG). Professora do Programa Mestrado em Enfermagem. Orientadora