

## AS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DA SÍFILIS CONGÊNITA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Amanda Medeiros Raffale<sup>1</sup>; Celso Guilherme da Silva <sup>2</sup>; Dáfine Kelly Maria Lopes da Silva<sup>3</sup>; Dayanna Ribeiro Gaia Dornela<sup>4</sup>; Ellyda Layanny Aguiar da Silva <sup>5</sup>; Geovany Antônio Alves Da Silva <sup>6</sup>.

amanda3993@gmail.com

### RESUMO:

**Introdução:** A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do *Treponema Pallidum*, da gestante infectada não-tratada ou inadequadamente tratada para o seu conceito, por via transplacentária e canal de parto. **Objetivo:** Identificar na literatura científica as principais complicações da Sífilis Congênita. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a partir da questão norteadora: Quais as complicações da Sífilis Congênita? Tendo artigos descritos na literatura científica brasileira e disponível na íntegra, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): SCIELO, LILACS, MEDLINE, a partir dos achados os artigos foram analisados e discutidos. Sendo utilizados os descritores: Sífilis Congênita, Transmissão Vertical e Gestante “aplicando o operador booleano “AND”. Teve como método de inclusão: artigos publicados entre 2011 a 2016, que possuem temática do tema em questão e que estão disponíveis gratuitamente na íntegra, e excluídos os estudos como relatos de experiências, resumos e com publicações duplicadas. Desta forma respeitando-se as normas de inclusão e exclusão a amostra final foi composta por 13 artigos. **Resultados:** Segundo as publicações avaliadas, demonstrou-se que a sífilis congênita não tratada ou tratada inadequadamente pode ocasionar complicações tanto precoces quanto tardias, além disso, são responsáveis por mais de 50% de morte intrauterina sob a forma de aborto, natimorto e óbito neonatal. A possibilidade de transmissão vertical está entre 30% e 100% dos casos, dependendo do estágio da sífilis gestacional. Em virtude, as complicações constatadas foram a prematuridade, baixo peso, danos neurológicos, comprometimento auditivo, oftalmológico, neurológico, déficit no desenvolvimento neuropsicomotor. **Conclusões:** Consideramos, a partir das análises que a dificuldade no acesso às consultas de pré-natal é considerado um dos principais fatores que elevam os índices da sífilis congênita. Desse modo, é de suma importância à adoção de medidas preventivas, tais como, estimular e facilitar o acesso precoce ao pré-natal e a realização de exames preconizados podem contribuir para a redução da transmissão vertical do *Treponema Pallidum*.

**DESCRITORES:** Sífilis Congênita; Transmissão Vertical; Gestante.

<sup>1</sup>Graduanda, cursando o 8º período de Enfermagem no Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), campus Recife, Pernambuco (PE), Brasil

<sup>2</sup>Enfermeiro; Fisioterapeuta; Especialista em fisioterapia em terapia intensiva neonatal e pediátrica; Especialista em Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia; Professor de Pós- Graduação em Engenharia de Segurança Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), campus Recife, Pernambuco (PE), Brasil