

## OS PRINCIPAIS FATORES DE ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR

Janilson Ferreira Alexandre<sup>1</sup>, Gildo Lopes de Oliveira Junior<sup>1</sup>, Sayonara França Durval<sup>1</sup>, Tatiane Muniz da Silva<sup>1</sup>,  
Dulcilene Joaquina da Conceição Cardoso<sup>1</sup>, Girlan Cândido da Silva<sup>2</sup>

janilsonalexandre@yahoo.com.br

### RESUMO:

**Introdução:** A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa que afeta diretamente os pulmões, podendo também acometer os rins, ossos, pele, cérebro, laringe e gânglios. Sua contaminação é por um micro-organismo denominado Mycobacterium Tuberculosis (também chamado de bacilo de Koch, descoberto em 1882 por Robert Koch), através das vias aéreas por micro gotículas expelidas no ar quando tossimos, falamos ou espirramos. Apresenta sintomas como a: tosse (produtiva ou não), febre alta vespertina (por mais de duas semanas) e perda de peso. **Objetivo:** O objetivo geral do trabalho é identificar os fatores determinantes que levam o paciente a abandonar o tratamento médico contra a TB. **Método:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura científica, a partir da questão norteadora Fatores que influenciam as pessoas a abandonarem o tratamento de TB A busca dos artigos ocorreu nas bases de dados BVS, Bireme, Scielo, Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde e FIOCRUZ. Foram selecionados artigos - apenas publicações nacionais (n=10). Utilizaram-se descritores booleanos “tuberculose” AND “epidemiologia” AND “promoção à saúde”. **Resultados:** Segundo os artigos analisados foram encontrados os seguintes fatores que levam o indivíduo a abandonar o tratamento contra TB: álcool e outras drogas (50%), capacitação profissional (50%), coinfeção pelo vírus HIV (40%), rotatividade de profissionais nas unidades de saúde, melhora dos sintomas e distância da residência até o serviço de saúde (20%), má alimentação, condição social, escolaridade e falta de informação (10%) são principais fatores de abandono. **Discussão:** A TB foi declarada em 1993 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo uma emergência mundial, ainda sendo considerada uma problemática da atenção primária, e o abandono do tratamento é uma das causas que mais aumentam a disseminação da doença. Neste sentido, para que se tenha uma melhora no contexto do tratamento da referida doença, um maior investimento por parte do poder público em: Centro de Atenção Social Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), favorecer qualidade de vida a população descrita e capacitação profissional para os membros das Unidades de Saúde da Família (USF) para melhor atender os pacientes. **CONCLUSÃO:** TB é uma doença curável, mas que ainda acomete grande parte dos brasileiros. Uma população bem informada é uma população bem assistida.

**DESCRITORES:** Tuberculose; Promoção à saúde; Epidemiologia.

---

<sup>1</sup>Acadêmico de Enfermagem do 9º período Uninassau. Recife – PE

<sup>2</sup>Mestre em Geografia pela UFPE. Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia pelo IFPE – Campus EAD. Recife – PE.